

Injection de GlucaGen® Hypokit

Conseils pour prendre en charge votre diabète

FICHE
3.4
PATIENT•ES


Le glucagon est présenté sous forme de kit tel que le GlucaGen® Hypokit. Il est destiné à être utilisé immédiatement pour faire face à des situations d'urgence chez les personnes diabétiques traitées par l'insuline ou par certains médicaments hypoglycémisants (à voir avec votre médecin).

Il est utilisé lorsque ces personnes s'évanouissent (perdent connaissance) en raison d'un taux de sucre dans le sang très faible. C'est ce qu'on appelle une «hypoglycémie sévère». GlucaGen® Hypokit (ou le kit de glucagon) est utilisé quand ces personnes ne sont pas en mesure d'avaler du sucre par la bouche.

Le glucagon est une hormone naturelle qui a l'effet inverse de l'insuline dans le corps humain. Il facilite la transformation d'une substance appelée «glycogène» en glucose (sucre) par le foie. Le glucose est alors libéré dans le sang – ce qui fait augmenter le taux de sucre sanguin.

Matériel nécessaire

Le GlucaGen® Hypo-Kit est composé d'un flacon de poudre sèche à reconstituer avec le solvant fourni.



Informez et formez votre entourage à l'utilisation du Glucagon

Si vous disposez du kit :

- Veillez à ce que les membres de votre famille, vos collègues ou amis proches connaissent GlucaGen® Hypokit. Dites-leur que si vous vous évanouissez (perdez connaissance), ils doivent immédiatement utiliser GlucaGen® Hypokit.
- Montrez aux personnes de votre entourage où vous conservez ce kit et comment l'utiliser. Elles doivent agir rapidement – si vous restez inconscient•e pendant une certaine période, ce peut être nocif. Il est important qu'elles soient formées et sachent comment utiliser GlucaGen® Hypokit avant que vous en ayez besoin.

Préparation



1. Enlevez le capuchon orange du flacon et injectez **tout** le liquide de la seringue dans le flacon.
2. Sans retirer l'aiguille du flacon, agitez légèrement le flacon, le flacon jusqu'à ce que Glucagon® soit complètement dissous et la solution claire.
3. Aspirez toute la solution dans la seringue. Pour éviter toute injection d'air, une goutte de glucagon doit d'abord apparaître au bout de l'aiguille.

Administration

Administrer pur, en bolus (d'un seul coup) par voie sous-cutanée (ou intramusculaire).
Attention : contre-indiqué si allergie au lactose !

Conservation

- Avant ouverture : jusqu'à la date de péremption au frigo (2-8°C) ou 18 mois à température ambiante (15-25°C), à l'abri de la lumière (la date de péremption ne doit pas être dépassée).
- Après ouverture : utilisation immédiate.

Références

Feuillet pour infirmiers « Hypoglycémie que faire ? », N. Marcoz, PIC, EHC, v1. 12.2013
Informations du fabricant NovoNordisk
Médicaments et Produits de Santé: www.afmps.be

Groupe ayant élaboré ou mis à jour le document

Groupe ayant élaboré le document (mai 2015)
Document élaboré par Noémie Marcoz

Groupe de révision (Décembre 2022)

Nancy Perrottet

Date de la fiche : mai 2015 / révisé en novembre 2017/révisé en décembre 2022
Date de la prochaine révision : décembre 2024