

# Utilisation du glucagon BAQSIMI®

## Conseils pour prendre en charge votre diabète

FICHE  
**3.4b**  
PATIENT•ES

BAQSIMI® est une forme de glucagon administré par pulvérisation nasale indiquée dans le traitement de l'hypoglycémie sévère (taux très bas de sucre dans le sang) chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 4 ans diabétiques.

Il est utilisé lorsqu'une personne se trouve dans une situation d'urgence due à une hypoglycémie sévère où elle est incapable de manger ou de boire et où elle a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre.

Le glucagon contenu dans le BAQSIMI® est une hormone naturelle qui a l'effet inverse de l'insuline dans le corps humain. Il facilite la transformation d'une substance appelée «glycogène» en glucose (sucre) par le foie. Le glucose est alors libéré dans le sang – ce qui fait augmenter le taux de sucre sanguin.

### Matériel nécessaire

Le BAQSIMI® est composé d'un récipient unidose de 3mg de poudre de glucagon nasale. Le récipient est à usage unique.



### Informez et formez votre entourage à l'utilisation du BAQSIMI®

Si vous disposez de ce médicament :

- Indiquez à votre famille et à vos amis l'endroit où vous conservez BAQSIMI® et expliquez-leur comment l'utiliser. Ils doivent savoir comment l'utiliser avant que vous en ayez besoin et doivent agir rapidement – si vous restez inconscient•e pendant une certaine période, ce peut être nocif. Il est important qu'ils soient formés à son utilisation.
- Il est important que les personnes autour de vous sachent reconnaître les signes possibles d'une hypoglycémie, afin qu'elles soient préparées et que vous puissiez compter sur leur aide. Dites-leur que si vous vous évanouissez (perdez connaissance), elles doivent immédiatement utiliser BAQSIMI®.

### Préparation

Retirez le film plastique en tirant sur la bandelette rouge. Ouvrez le couvercle et retirez le récipient du tube. BAQSIMI® est prêt à l'emploi : il ne nécessite pas d'être reconstitué.



## Administration

### Administration de la dose :



- **TENEZ** le récipient unidose comme montré sur l'image. **N'appuyez pas sur le piston avant l'insertion dans la narine.**



- **INSEREZ** l'embout dans l'une des narines.



- **APPUYEZ** sur le piston entièrement **jusqu'à ce que la ligne verte ne soit plus visible.**

- Il n'est pas nécessaire d'inhaler ni d'inspirer profondément après l'administration. BAQSIMI® doit être administré en cas de situation d'urgence due à une hypoglycémie sévère (taux très bas de sucre dans le sang), même si vous êtes inconscient•e, que votre nez est bouché ou que vous avez pris des décongestionnants
- BAQSIMI® contient 1 seule dose de glucagon : n'appuyez pas sur le piston avant d'être prêt•e à administrer la dose. Sinon, la dose unique du récipient sera perdue.

## Conservation

- Il n'est pas nécessaire de conserver BAQSIMI® au réfrigérateur.
- Il doit être conservé à une température ne dépassant pas 30°C.
- Le glucagon poudre nasale doit rester dans son tube scellé avec un film en plastique jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé. Si le tube a été ouvert, le récipient unidose peut avoir été exposé à l'humidité. Cela pourrait altérer l'efficacité attendue de Baqsimi. Examiner périodiquement si le tube est bien scellé par le film plastique. Si le tube a été ouvert, remplacer le médicament.

### Références

- Informations du fabricant Eli Lilly
- Swissmedicinfo.ch

### Groupe ayant élaboré ou mis à jour le document

#### Groupe ayant élaboré le document (Décembre 2022)

Document élaboré par Nancy Perrottet, validé par Dres Daniela Sofrà et Patricia Halfon

Date de la fiche : décembre 2022

Date de la prochaine révision : décembre 2024